Le pharmacien GMF, un intervenant pivot dans l'équipe de soins



Selon le cadre de financement des GMF 2017 du MSSS, infirmières, PHM et TS font d'emblée partie de l'équipe GMF. Les autres professionnels peuvent être intégrés et financés selon la taille du GMF. Le choix de ceux-ci est à la discrétion du GMF, en fonction de sa clientèle et de ses besoins.

** Bien que les PHM communautaires et hospitaliers interagissent surtout avec les PHM, MD et infirmières du GMF, ils peuvent parfois être appelés à collaborer avec les autres intervenants du GMF.*

Légende
PHM : Pharmacien ; TS : Travailleuse sociale ; MD : Médecin

RQP GMF Réseau Québécois des Pharmaciens GMF

EXEMPLES DE PATIENTS À ORIENTER VERS LE PHARMACIEN GMF...

Réseau Québécois des Pharmaciens GMF

Médecins, infirmières...

Patients avec …

Pharmacothérapie complexe

- Diabète, hypertension, douleur, troubles de l'humeur difficiles à contrôler

Pharmacothérapie exigeant des suivis étroits et des ajustements fréquents

- Personnes âgées fragiles, insuffisance rénale chronique, polymédication, Rx à risque (indice thérapeutique étroit)…

Épisodes fréquents d'hospitalisation

- EAMPOC fréquentes, chutes, débalancements glycémiques ou électrolytiques

Adhésion problématique ayant un besoin accru de soutien

- Sevrage de benzo., asthme difficile à contrôler...

Pharmacien GMF

Prise en charge des patients du GMF <u>référés</u> par les différents professionnels de la santé pour une pratique collaborative et l'optimisation de la continuité des soins aux patients

Autres pharmaciens

Dossiers complexes et lourds et/ou patients vulnérables qui bénéficieraient d'une révision de la médication

- Plusieurs comorbidités, personnes âgées/frêles, polymédication, suspicion syndrome gériatrique ou cascade médicamenteuse

<u>Par le pharmacien communautaire :</u>

Préoccupation/crainte pour la santé du patient avec difficultés à rejoindre le médecin

- Inobservance, incompréhension du Tx
- Sevrage de Rx/déprescription : BZD; hypnotiques; antipsychotiques

<u>Par le pharmacien d'établissement :</u>

Recommandations sur la pharmacothérapie qui n'ont pas pu être appliquées dans un contexte de soins aigus